

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



Les hypoglycémies

DR BOUYOUCF

INTRODUCTION

- Hypoglycémie se définit comme un Sd clinique et biologique suite à un abaissement anormal de La glycémie inférieur à 0.5 g/l.

urgence diagnostic et thérapeutique.

Rappels physiopathologiques

- Le glucose provient de l'alimentation et de la production hépatique(néoglucogenèse et glycogénolyse).
- Le glucose alimentaire assure une glycémie normale pendant 5h.au- delà c'est la production endogène qui prend le relais pdt 72 h, plus tard c'est la lipolyse.
- La réponse à une hypoglycémie est automatique grâce à des facteurs hormonaux.
- Le glucagon , les catécholamines ,GH , le cortisol ce sont des hormones hyperglycémiantes qui améliore l'hypoglycémie.
- Les facteurs neuro- glucorégulateurs maintien l'équilibre glycémique.

Diagnostic positif

- La triade de whipple : les manifestations cliniques d'hypoglycémie ,un taux de glycémie inférieur 0.5g/l et une disparition de ces signes après resucrage.
- 1. L'interrogatoire: notion de prise de médicaments hypoglycémiants et d'éthylisme. Profil psychologique du patient. connaitre la symptomatologie et l'horaire ainsi que la disparition après resucrage .

2. Les symptômes cliniques: 2 groupes:

- les symptômes neurovégétatifs(SNA) pour seuil glycémique entre 0.6-0.65g/l.
- Les symptômes neuro glycopéniques pour seuil inférieur 0.5 g/l.

Symptômes neurovégétatifs

Signes les plus fréquents

Mains moites, sueurs froides, pâleur des extrémités, tachycardie avec palpitation.

Signes les moins fréquents

Tbles du rythme, poussées hypertensives, crise d'angor, nausées voir vmts.

Signes neuro glycopéniques

Flou visuel, céphalées, difficultés de concentration et d'élocution. tbles psychiatrique, tbles neurologiques (crises convulsives généralisées ou localisées).

traitement

Urgence thérapeutique.

Si patient conscient:

- 10-20 gde glucose(4-6 morceaux de sucre)
- Ou un verre de jus sucré , limonade.
- Après relais avec un sucre lent.

Si patient inconscient:

- Injection en IM ou en S/C 1 mg de glucagon.
- En cas d 'échec ou non disponibilité= 40-80 cc de SG 30ou 50 puis 10. Une fois réveillé apport sucre rapide puis lent.si hypogl secondaire aux sulfamides hypogl. maintient le SG10/au m/2 hospitalier.

Hypoglycémies en dehors du diabète

1. Hypoglycémies réactives:

- hypoglycémie post - prandiale idiopathique (fqte), les symptômes neurovégétatifs s'observe 2 à 5 h après un repas, au moment du malaise la glyc sup 0.6 g/l dans 2/3 des cas.

il faut conseiller : des sucres lents, augmenter la ration de fibres alimentaires et de protéines. si persistance = inhibiteur de α glucosidase.

- **hypoglycémie réactive digestive:** se voit : gastrectomie, vagotomie .l'hypogl apparait 1à2 h après un repas. On préconise le fractionnement des repas et éviction des sucres rapides.
- **Hypoglycémie réactionnelle tardive dans le pré diabète de type 2:** rencontré dans l'intolérance aux hydrates de carbone(4-5h après repas).intérêt de fractionner les repas et privilégier les aliments à faible index glycémique.

2.Hypoglycémies organiques: moins fréquentes, surviennent à jeun ou en post prandial tardif, lors d'un effort physique. elles sont

- d'origine tumorale: insulinome (tumeur endocrine rare, maligne dans 1 cas sur 10 se voit à tout âge à localisation unique ou multiple), tumeur mésoenchymateuse....
- d'origine non tumorale (endocrinienne : IS, IAH ou auto-immune: auto-anticorps anti insuline)
- hypoglycémie multifactorielles (IH sévère, IRC, malnutrition protéino-calorique).

Hypoglycémie iatrogène

- Hypoglycémie médicamenteuse: certains anti-arythmiques bêtabloquants non cardio- sélectifs, les antidépresseurs tricycliques..
- Hypoglycémie toxique : alcool.
- Hypoglycémie factice.

Hypoglycémie du diabétique

- **Chez le diabétique traité par insuline** : doses élevées d'insuline , apports glucidiques insuffisants , activité physique intense , défaut des hormones de contre régulation comme dans la neuropathie végétative.
- **Chez le diabétique de type2**: sulfamides hypoglycémiants et les glinides.